

با سمه تعالی

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۸		

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>کوتاه پاسخ دهید.</p> <p>(الف) درجه تابع $f(x) = x^3(1-x)$ را مشخص کنید.</p> <p>(ب) در فاصله $[1, 0]$ از بین دو تابع $f(x) = x^3$ و $g(x) = -f(x)$، نمودار کدام تابع پایین تر قرار دارد؟</p> <p>(پ) نمودار تابع $y = f(x)$، قرینه نمودار تابع $y = f(x)$ نسبت به کدام محور است؟</p> <p>(ت) تابع $h(x) = x+2$ در چه بازه‌ای اکیداً صعودی است؟</p>	۱
۱	<p>نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = f(3-x)$ را رسم کرده و دامنه آن را تعیین کنید.</p>	۲
۱	<p>مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چند جمله‌ای $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ بر $(x-2)(x+1)$ بخش پذیر باشد.</p>	۳
۰/۵	<p>اگر $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$، حدود x را به دست آورید.</p>	۴
۱/۵	<p>دوره تناب، مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع $y = -3\cos(\pi x) + 1$ را مشخص کنید.</p>	۵
۰/۵	<p>کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟</p> <p>(الف) تابع تانژانت در بازه $(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ اکیداً صعودی است.</p> <p>(ب) نقاطی به فرم $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$، ($k \in \mathbb{Z}$) در دامنه تابع تانژانت قرار دارند.</p>	۶
۱	<p>معادله مثلثاتی $\sin 3x = \sin 2x$ را حل کنید.</p>	۷
۰/۵	<p>با توجه به نمودار تابع f که در شکل زیر آورده شده است، به سوالات پاسخ دهید.</p> <p style="text-align: center;">الف) $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$</p>	۸
۱/۷۵	<p>حدهای زیر را محاسبه کنید.</p> <p>(الف) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{(x-1)^2}$</p> <p>(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x - 1)$</p> <p>(پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x^3 - 4x}$</p>	۹
«ادامه سوالات در صفحه دوم»		

با سمه تعالی

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۸ http://aee.medu.ir			


ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۰	مجانب های قائم و افقی نمودار تابع $y = \frac{x+3}{3-x}$ را بنویسید.	۰/۷۵
۱۱	با توجه به نمودار داده شده، گزینه مناسب را انتخاب کنید. (i) در کدام نقطه مماس افقی بر نمودار رسم می شود? (ii) شیب خط مماس در نقطه F چه علامتی دارد? (iii) شیب خط مماس بر نمودار، در نقطه D نسبت به نقطه B چگونه است? (الف) مثبت (ب) منفی (الف) بیشتر (ب) کمتر	۰/۷۵
۱۲	مشتق پذیری تابع $f(x) = x^3 - 4 $ را در $x = 2$ بررسی کنید.	۲
۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (الف) $f(x) = (2x^3 + \sqrt[3]{x} - 1)^4$ (ب) $g(x) = \cos\left(\frac{x}{x^3 + 1}\right)$	۲/۲۵
۱۴	آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع $f(x) = 2x^3 + 5x + 1$ در نقطه $x = 2$ چند برابر آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در $x = -1$ است?	۱
۱۵	مقادیر اکسترمم های نسبی و مطلق تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ را در بازه $[-2, 3]$ به دست آورید.	۱/۷۵
۱۶	ابتدا جهت تقریز تابع $y = \frac{x+1}{x-1}$ را مشخص کرده، سپس وجود نقطه عطف آن را بررسی کنید.	۱/۵
۱۷	جدول رفتار و نمودار تابع $y = x^3 + 3x^2 + 1$ را رسم کنید.	۱/۲۵
۲۰	جمع نمره موفق و سربلند باشید.	

مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) ۷ (۰/۲۵) (کار در کلاس صفحه ۱۱) پ) محور طول ها (۰/۰۵) (نکته صفحه ۷)	۱
۲	(تمرین ۲، قسمت ث، صفحه ۱۲) $D_g = [-2, 3] \quad (0/5)$	۱
۳	$\begin{aligned} 8 + 4a + 2b + 1 &= 0 \Rightarrow 4a + 2b = -9 \quad (0/25) \\ -1 + a - b + 1 &= 0 \Rightarrow a - b = 0 \quad (0/25) \end{aligned}$ $\Rightarrow \begin{aligned} a &= -\frac{3}{2} \quad (0/25) \\ b &= -\frac{3}{2} \quad (0/25) \end{aligned}$	۱
۴	(قسمت ۴ کار در کلاس صفحه ۱۸)	۰/۵
۵	(مشابه مثال صفحه ۲۷) $T = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \quad (0/5)$, $\max = -3 + 1 = 4 \quad (0/5)$, $\min = - -3 + 1 = -2 \quad (0/5)$	۱/۵
۶	الف) درست (۰/۰) (قسمت پ کار در کلاس صفحه ۳۱) ب) نادرست (۰/۰) (نکته بالای صفحه ۳۲)	۰/۵
۷	(مثال دوم صفحه ۳۹) $\begin{aligned} 3x &= 2k\pi + 2x \quad (0/25) \Rightarrow x = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/25) \\ 3x &= (2k+1)\pi - 2x \quad (0/25) \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{5} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/25) \end{aligned}$	۱
۸	الف) $+\infty \quad (0/25)$ (مشابه کار در کلاس صفحه ۵۰) ب) ۱ (۰/۰) (مشابه کار در کلاس صفحه ۱)	۰/۵
۹	(قسمت پ کار در کلاس صفحه ۵۳) الف) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} \quad (0/25) = +\infty \quad (0/25)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-2 + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3) \quad (0/25) = +\infty \quad (0/25)$ پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x^5} \quad (0/25) = \frac{1}{2} \quad (0/25)$	۱/۷۵
۱۰	م. قائم: $x = 2 \quad (0/25)$ (مشابه تمرین ۴ صفحه ۶۹)	۰/۷۵
۱۱	الف (ثبت) (۰/۰) (ii) ب (کمتر) (۰/۰) (iii) ب (مشبی) (۰/۰) (iv) ب (E) (۰/۰)	۰/۷۵
۱۲	(مشابه مثال صفحه ۸۶) $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ x^3 - 8 - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}}_{(0/25)} = 4 \quad (0/25)$	۲

«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»

مدت امتحان: ۱۳۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x^r - 4)}{x - 2} \quad (0/25) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = -4 \quad (0/25) \Rightarrow f'_+(2) \neq f'_-(2) \quad (0/25)$ تابع در این نقطه مشتق پذیر نیست. $(0/25)$	ادامه
۱۳	$f'(x) = \underbrace{4}_{(0/25)} \underbrace{(2x^r + \sqrt[3]{x} - 1)^r}_{(0/25)} \underbrace{(6x^r + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}})}_{(0/5)}$ (الف) $g'(x) = -\sin(\frac{x}{x^r + 1}) \quad (0/5) \times \frac{(0/25)(x^r + 1) - 2x^r \quad (0/25)}{(x^r + 1)^r \quad (0/25)} \quad (ب)$	
۱۴	$f'(x) = 4x + 5 \quad (0/25) \Rightarrow f'(-1) = 1 \quad (0/25)$ $f'(2) = 13 \quad (0/25)$ برابر $(0/25)$. زیرا: (\bar{A}) متوجه ای تغییر از صفحه ۱۰۲ تا صفحه ۱۱۰	۱
۱۵	$f'(x) = x^r + 2x \xrightarrow{f'=\circ} x = \circ, x = -2 \Rightarrow f(-2) = \frac{4}{3} \quad (0/25), f(\circ) = \circ \quad (0/25)$ مینیمم مطلق $f(3) = 18 \quad (0/25)$ ماکریمم مطلق $\begin{array}{c ccccc} x & -2 & \circ & & & \\ \hline f' & + & \circ & - & \circ & + \\ \hline f & \nearrow \frac{4}{3} & \searrow & \circ & \nearrow & (0/5) \end{array}$ (مشابه مثال صفحه ۱۲۳)	
۱۶	$y' = \frac{-2}{(x-1)^2} \quad (0/25), y'' = \frac{4}{(x-1)^3} \quad (0/25)$ $x-1 = \circ \Rightarrow x = 1$ در بازه $(1, +\infty)$ تقریز رو به بالا $(0/25)$ در بازه $(-\infty, 1)$ تقریز رو به پایین $(0/25)$ قسمت ب تمرین ۲ صفحه ۱۳۶	$\begin{array}{c ccccc} x & -\infty & 1 & +\infty & & \\ \hline f'' & - & & + & & \\ \hline f & 1 & -\infty & \vdots & +\infty & 1 \quad (0/25) \end{array}$ نقطه عطف ندارد. $(0/25)$
۱۷	$y' = 3x^r + 6x \quad (0/25) \xrightarrow{y'=\circ} x = \circ, x = -2$ $\begin{array}{c ccccc} x & -\infty & -2 & \circ & +\infty & \\ \hline f' & + & \circ & - & \circ & + \\ \hline f & -\infty & \nearrow 5 & \searrow 1 & \nearrow +\infty & \quad (0/5) \end{array}$ ماکریمم مینیمم (مشابه قسمت ب تمرین ۱ صفحه ۱۴۴)	

" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است."